



Priprema zem-  
ljišta

Sadnja

Vegetativni  
porast

Cvetni pupoljci  
vidljivi u kruni

Cvetanje - zeleni  
plodići

Berba

Posle berbe



Granulisana  
NPK

12 - 10 - 18 GG

100 - 150 kg



Mono đubrivo

Iperen IPE® 13 - 32 - 13 + TE

40 - 60 kg

Iperen IPE® 20 - 13 - 20 + TE

40 - 60 kg

75 - 100 kg

75 - 125 kg

Colo 10 - 5 - 38 +  
3MgO + TE

200 - 250 kg

Magnezijum Sulfat HG

40 - 60 kg

40 - 60 kg

Kalijum Sulfat  
(SOP) HG

75 - 100 kg

Kalcijum Nitrat HG

75 - 125 kg

75 - 125 kg

Iperen IPE® Tečnost 3 - 15 - 0

20 L

20 L

10 L

Stim Concentrate AA Tečnost

3 L/ha

3 L/ha

Iperen Fer Triathlon

5 kg

5 kg

Vodotopiva NPK

Napredna  
đubrivo

Proizvod na bazi  
morskih algi

Mikro-  
elementi

Napredna  
đubrivo

Proizvod na bazi  
morskih algi

Mikro-  
elementi

Iperen WAKE-up Tečnost

1 - 2x, 5L, 7 - 10  
dana, min. 500 L

1 - 2x, 5L, 7 - 10  
dana, min. 500 L

FoliaStim® Mn Zn  
Tečnost

1x, 2 - 4 L/ha,  
min 200 L

Stim Concentrate  
AA Tečnost

1 - 2x, 1,5 - 2 L/ha

FoliaStim® Mn Zn  
Tečnost

1x, 2 - 4 L/ha,  
min. 200 L

FoliaStim® B  
Tečnost

1x, 2 - 4 L/ha, 7 - 10  
dana, min. 300 L

FoliaStim® B  
Tečnost

1x, 2 - 4 L/ha, 7 - 10  
dana, min. 300 L

Napomena: Pomenute indikovane doze i faze aplikacije su date kao smernice. Tačne doze, koncentracija i faza aplikacije zavise od lokalnih uslova, upotrebi drugih đubriva i mogu da se daju posle objektivne dijagnoze. U slučaju ishrane putem lista u sklopu mešavine sa proizvodima za zaštitu useva, pre pripreme mešavine za prskanje treba uraditi test kompatibilnosti. Umesto FoliaStim® B Tečnost može se primeniti kombinacija Stim Concentrate AA Tečnost 1 L/ha i Oligo Bor 150 g/L Tečnost 1 L/ha.